



FICHA TÉCNICA

BRAVECTO PLUS FOR CAT®

USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:

Cada mL contiene 280 mg de fluralaner y 14 mg de moxidectina.

Cada pipeta libera:

BRAVECTO PLUS solución tópica	Contenido de la pipeta (mL)	Fluralaner (mg)	Moxidectina (mg)
para gatos pequeños 1.2 – 2.8 kg	0.4	112.5	5.6
para gatos medianos >2.8 – 6.25 kg	0.89	250	12.5
para gatos grandes >6.25 – 12.5 kg	1.79	500	25

FOTO DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Bravecto Plus 112.5 mg / 5.6 mg
Solución tópica para gatos pequeños (1.2 – 2.8 kg)

Bravecto Plus 250 mg / 12.5 mg
Solución tópica para gatos medianos (>2.8 – 6.25 kg)

Bravecto Plus 500 mg / 25 mg
Solución tópica para gatos grandes (>6.25 – 12.5 kg)

INDICACIONES:

Para gatos que tienen, o bien, están en riesgo de tener infestación parasitaria mixta por pulgas y garrapatas, nemátodos gastrointestinales (larvas de 4ta etapa, adultos inmaduros y adultos de *Toxocara cati* y *Ancylostoma tubaeforme*) o gusanos del corazón.

ESPECIES DESTINO:

Gatos

FORMA FARMACÉUTICA:

Solución tópica

DESCRIPCIÓN:

Para gatos con o en riesgo de sufrir la infestación parasitaria mixta de pulgas y garrapatas, nemátodos gastrointestinales (larvas de 4ta etapa, adultos inmaduros y adultos de *Toxocara cati* y *Ancylostoma tubaeforme*) o gusanos del corazón.

**DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

Para uso tópico.

Bravecto Plus solución tópica está disponible en tres presentaciones. La siguiente tabla define el tamaño de la pipeta que se debe usar de acuerdo con el peso corporal del gato (correspondiente a una dosis de 40-94 mg fluralaner/kg de peso corporal y 2-4.7 moxidectina/kg de peso corporal):

Peso del gato (kg)	Tamaño de la pipeta que se debe usar
1.2 – 2.8	Bravecto Plus 112.5 mg + 5.6 mg solución tópica para gatos pequeños
>2.8 – 6.25	Bravecto Plus 250 mg + 12.5 mg solución tópica para gatos medianos
>6.25 – 12.5	Bravecto Plus 500 mg + 25 mg solución tópica para gatos grandes

CONTRAINDICACIONES:

No se use en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a cualquiera de los excipientes.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones para su uso en animales:

En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto.

Precaución que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales: (Síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

En caso de intoxicación o sobredosis, llamar o acudir rápidamente a un centro hospitalario y mostrar empaque o etiqueta del producto.

Precauciones de Almacenamiento:

No se almacene a más de 30°C.

Las pipetas deberán mantenerse dentro de sus empaques para evitar la pérdida de solvente o la absorción de humedad. Los empaques sólo deberán abrirse inmediatamente antes de usarlos.

PERIODO DE RETIRO:

No aplica.

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos.

INFORMACIÓN ADICIONAL: www.msd-salud-animal.com.pa

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA.



MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

ELABORADO POR:
Intervet International B.V.
Boxmeer, Holanda

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
INTERVET CENTRAL AMÉRICA SA
Bajo Licencia de Intervet International B.V.