

FICHA TÉCNICA

NOBIVAC® DAPPV + L4

USO VETERINARIO

RESUMEN DE LA DESCRIPCIÓN

FÓRMULA:

Cada dosis contiene:

Fracción liofilizada:

| | |
|--|--|
| Virus vivo modificado CDV, cepa distemperoid | ≥ 10 ^{3.7} TCID ₅₀ |
| Virus vivo modificado CAV-2, cepa ditchfield | ≥ 10 ^{4.8} TCID ₅₀ |
| Virus vivo modificado CPI, cepa CPI-PR | ≥ 10 ^{4.3} TCID ₅₀ |
| Virus vivo modificado CPV, cepa SAH-CPV-2b | ≥ 10 ^{5.3} FAID ₅₀ |

Fracción líquida

| | |
|--|-------------------------------|
| <i>Leptospira interrogans</i> serovar <i>canicola</i> , cepa LC-NY | ≥ 80 hámster PD ₈₀ |
| <i>Leptospira interrogans</i> serovar <i>icterohaemorrhagiae</i> , cepa LI-11403J | ≥ 80 hámster PD ₈₀ |
| <i>Leptospira interrogans</i> serovar <i>pomona</i> | ≥ 80 hámster PD ₈₀ |
| <i>Leptospira interrogans</i> serovar <i>gryppytyphosa</i> | ≥ 80 hámster PD ₈₀ |

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Caja con 25 unidades de frasco/vial con liofilizado por 1 dosis, acompañado por diluyente estéril.

INDICACIONES:

La vacuna Nobivac® DAPPv es una vacuna de virus vivos modificada que es recomendada para la vacunación de perros sanos como ayuda en la prevención de la enfermedad causada por el virus del moquillo canino, adenovirus canino tipo 1 (hepatitis), virus de la parainfluenza canina, y parvovirus canino.

Nobivac® L4 es recomendada para la vacunación de perros sanos como ayuda en la prevención de la enfermedad y mortalidad causadas por *L. canicola*, *L. icterohaemorrhagiae*, *L. pomona* y *L. gryppytyphosa*; la prevención de leptospiuria (eliminación de *Leptospira* en orina) causada por *L. canicola*, *L. icterohaemorrhagiae*, y *L. gryppytyphosa*; y como ayuda en la prevención de leptospiuria causada por *L. pomona*.

ESPECIES DESTINO:

Caninos

FORMA FARMACÉUTICA:

Polvo liofilizado y diluyente para reconstituir, suspensión inyectable

DESCRIPCIÓN:

Nobivac® DAPPv+L4 es la combinación de una vacuna viva modificada liofilizada (Nobivac® DAPPv) y una bacterina inactivada líquida (Nobivac® L4) utilizada como diluyente.

Nobivac® DAPPv contiene virus vivos modificados del moquillo canino, adenovirus canino tipo 2, parainfluenza canina y parvovirus canino.

Nobivac® L4 es una bacterina líquida inactivada, contiene *L. canicola*, *L. icterohaemorrhagiae*, *L. pomona* y *L. gryppytyphosa*.

FOTO DEL
PRODUCTO

1

| | |
|---|--|
| DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: | |
| Agitar el vial de Nobivac® Lepto4 y transferir su contenido al vial de Nobivac® DAPPv de forma aséptica. Mezclar suavemente hasta que esté disuelto. Utilizar todo el contenido de inmediato después de la rehidratación. Administrar una dosis (1 ml) por vía subcutánea. | |
| CONTRAINDICACIONES: | |
| Ninguna | |
| PRECAUCIONES ESPECIALES: | |
| <i>Precauciones para su uso en animales:</i> | |
| En caso de sobredosis, o error en la vía de aplicación del producto, acuda o llame inmediatamente al médico veterinario y presente la etiqueta del producto. | |
| <i>Sobredosis en humanos (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):</i> | |
| En caso de exposición inadecuada al producto, o ingestión de este, acuda a un Centro Hospitalario y presente la etiqueta del producto. | |
| <i>Precauciones de Almacenamiento:</i> | |
| Almacene entre 2° y 7°C. NO CONGELAR. | |
| PERIODO DE RETIRO: | |
| No aplica. | |
| PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO: | |
| Si no se describe ninguna especificación especial en la etiqueta para eliminar este producto, deseche de la misma manera en que dispone de otros productos. | |
| INFORMACIÓN ADICIONAL: https://www.msd-salud-animal.com.pa/ | |
| PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE. | |
| CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. | |
| SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA. | |
| MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE LOS ANIMALES DOMÉSTICOS. | |
| ELABORADO POR: Intervet Inc., EE.UU. | IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: INTERVET CENTRAL AMERICA S DE RL Bajo Licencia de Intervet International B.V. |